

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 15-6-84379476

N° ISSN 0756 640
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE"

(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
280, rue de Fougères, 35000 RENNES — Tél. (99) 36.01.74

ABONNEMENT ANNUEL : 115 F

Sous-Régisseur de recettes de la D. D. A.
PROTECTION DES VÉGÉTAUX
C. C. P. RENNES 9404-94 Y

BULLETIN "CULTURES MARAÎCHÈRES DE SERRE, CULTURES
LEGUMIÈRES DE PLEIN CHAMP ET POMMES DE TERRE, n° 96 -

8 JUIN 1984

POMMES DE TERRE : Le mildiou s'essouffle dans les primeurs, mais attaque les semences.

Attention, il fait bon ménage avec l'orage

PEPINIÈRES DE CHOUX : Surveillez les cotylédons; champignons et insectes en sont friands !

SERRES :

- **Tomates :** Diverses maladies dues à l'hygrométrie élevée
- **Melons, concombres :** Acariens, Ascochyta
- **Des pucerons sur diverses cultures**

POMMES DE TERRE DE PRIMEUR

MILDIOU -

Actuellement, la situation est saine, les foyers de mildiou détectés il y a trois semaines ont régressé grâce aux traitements.

Les dernières contaminations datent du 27 mai, les sorties de taches le 6 juin.

Il n'est plus utile d'employer l'Acylon P. Appliquez un produit de contact sur les pommes de terre qui ne seront pas récoltées avant la mi-juin.

Gardez présent à l'esprit que mildiou et orage sont de bons amis et aiment faire des ravages.

DORYPHORES -

Des adultes ont été trouvés à Ploumoguier (29 N). Nous vous rappelons que la lutte est obligatoire (le Birlane à 60 cm³/hl donne de bons résultats).

POMMES DE TERRE DE SEMENCE ET DE CONSERVATION

MILDIOU -

Le 28 mai, les premières taches ont été détectées dans le Finistère Nord à Lanrivouaré, St-Pol, Lesneven, Sizun et le 6 juin, à Locminé dans le Morbihan.

Traitez dès que les pommes de terre atteignent une hauteur de 15-20 cm, détruire les repousses et tas de déchets.

Effectuez une nouvelle application sur les pommes de terre ayant déjà reçu un traitement il y a deux semaines.

P. 41

ECHALOTES - OIGNONS

Maintenez la protection contre le mildiou et les botrytis.

PEPINIERES DE CHOUX

MALADIES -

Dès l'apparition des cotylédons, protégez les plantules contre l'Alternaria et le Mildiou, avec le mélange Dithane (ou Fulvax, Rémitline, Sandozèbe ...) + Rovral (ou Kidan).

INSECTES -

Attention, les altises ("puces de terre" de couleur bleue ou noire avec parfois des lignes jaunes) peuvent mordre le feuillage et ralentir la végétation.

Évaluez l'importance des risques et intervenez si nécessaire avec, pour 1 000 m² :
Thiodan : 70 cm³; Ultracide : 130 cm³; Rhodiatox : 250 cm³; Birlane : 63 cm³ ...

DESHERBAGE POST-SEMI

Si vous n'avez pas désherbé avant le semis, vous pouvez appliquer : (doses pour 1 000 m²)
Dacthal : 1 kg; Ramrod : 930 cm³; Mafog : 700 g
Lasso : 600 cm³.

CULTURES DE SERRE

TOMATE

BOTRYTIS - CLADOSPORIOSE : Les attaques continuent. Le premier remède consiste à aérer largement et à limiter les arrosages pour éviter la persistance de flaques d'eau dans la serre.

Alternez les produits de traitement (cf bulletin du 24 mai).

ALTERNARIA : Il est présent dans quelques serres et se présente sous forme de taches avec cercles concentriques sur feuilles et parfois sur fruits.

• Réduire l'humidité

• Fongicides efficaces : captafol (Difosan, Orthodifolatan), chlorothalonil (Daconil), mancozèbe (Dithane M 45, Sandozèbe).

MOELLE NOIRE : Cette maladie continue à être observée. Des traitements avec une spécialité à base de cuivre peuvent la prévenir ou la limiter : UC 70, Cuprofix

CZ, bouillie bordelaise.

Opérez de préférence après les tailles et évitez les apports excessifs d'azote.

MELON - CONCOMBRE

ACARIENS : On les trouve parfois en grand nombre.

Intervenez avec :

- Azocyclotin : Peropal
- Dicofol : Carbox, Dicophyt, Sovifol, Kelthane
- Cyhexatin : Plictran (risque de brûlures)

Ces produits ne sont pas dangereux pour les abeilles.

On peut aussi recourir à la lutte biologique avec *Phytoseiulus persimilis*.

ASCOCHYTA : Dans les serres peu ou non chauffées cette maladie a tendance à s'installer.

Suivez les conseils donnés dans le bulletin du 24 mai.

PUCERONS SUR DIVERSES CULTURES DE SERRE

Continuez à surveiller la présence de pucerons et à effectuer un traitement si nécessaire.